

親♥的您生病了嗎？

藥物一:QUETIAPINE 200MG 睡前服用

適應症:思覺失調症、雙極性疾患之躁症發作

副作用:嗜睡、頭暈、便秘、消化不良、胃不適、口乾、體重增加等

用法與用量:每天150~750mg，依個別病人的臨床反應及對藥物的耐受性作調整。



藥物二:FLURAZEPAM HCL 30MG 睡前服用

副作用:嗜睡、暈眩、頭重腳輕感、噁心、口渴。

適應症:失眠

用法與用量:通常劑量在15~60mg之間。一般成人劑量是睡前服用30mg，老年人及體弱者，開始劑量是15mg



藥物三:CLONAZEPAM 2MG 睡前服用

副作用:嗜睡、動作不協調、唾液分泌增加等

適應症:癲癇

用法與用量:通常成人每天三次，每次0.5mg。劑量必須依病人臨床反應，藥物耐受性和病人年齡而個別調整



藥物四:ZOLPIDEM 10MG 睡前服用

適應症:失眠症

副作用:頭痛、頭暈、記憶障礙、夢遊等。

用法與用量:每天5~10mg，睡前服用。每日最高劑量為10mg



藥物五:TRAZODONE HYDROCHLORIDE 50MG 睡前服用

適應症:治療各種型態之抑鬱症

副作用:嗜睡、神經質、口乾、頭昏、低血壓、視線模糊等。

用法與用量:最初建議每天150mg，每天最高劑量為400mg



• 看完之後，您覺得此人是得了什麼症狀？

1. 躁鬱症
2. 精神裂症
3. 憂鬱症
4. 自閉症

答案是:3，您答對了嗎？